



PREPARO PARA COLONOSCOPIA
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA PESSOAS NÃO RESSECADAS
Agendadas a partir das 10:00hrs.

1. A Colonoscopia é um exame onde se avalia o intestino grosso, que compreende do RETO ao CECO, numa extensão de aproximadamente 80 cm. Realizamos exames na clínica de pessoas entre 14 e 80 anos com suporte anestésico
2. Esse exame leva em média 20 minutos e em geral é realizado sob sedação endovenosa.
3. Para melhor resultado do exame, o intestino deve estar limpo de fezes, permitindo o exame preciso da mucosa intestinal.
4. O cliente deve suspender, com o consentimento de seu médico, o uso de medicações anticoagulantes, a exemplo de varfarina (Marevan® e Coumadin®), clopidogrel (Plavix®, Plagrel® e Iscover®) e ticlopidina (Ticlid®), assim como de sulfato ferroso e Xenical® 8 dias antes da data do exame. O ácido acetilsalicílico (AAS® e Aspirina®) não precisa ser suspenso. Se faz uso de Semaglutina (Ozempic, Wegovy, Rybelsus), Livaglutina (Victoza ou Saxenda) Tirzepatida (Mounjaro) devem suspender estes medicamentos 21 dias antes do exame. Forxiga e Jardiane suspender 03 dias antes do exame.
5. Na véspera do exame, durante todo o dia à, o paciente deve ingerir apenas dieta líquida (sucos, gelatina, sopas coada, água refrigerantes entre outros). Deve ingerir no mínimo 3 litros de água no dia. Não deve ingerir leite e derivados, alimentos sólidos, com fibras, legumes, verduras, frutas e óleo no preparo.
6. Ainda na véspera ingerir 4 comprimidos de **DULCOLAX** as 16 hrs. Você terá diarreia 6 hrs após a ingestão do Dulcolax.
7. No dia do exame no período das 06:00 hs às 07:00 hs da manhã, ingerir 100 gramas de **MANITOL** diluído em 500 ml de água (ou) em 500 ml de suco + 1 vidrinho (pequeno) de **LUFTAL**. Isto também causa diarreia e talvez um pouco de cólicas. **É importante caminhar enquanto ingere o MANITOL e após ingeri-lo**
8. No dia do exame, **até três horas antes do exame**, pode ingerir chá, água ou suco coado. É obrigatório vir acompanhado por uma pessoa maior de 18 anos. Na ausência do acompanhante exame não poderá ser realizado.
9. Após o exame, o paciente poderá permanecer em repouso na clínica cerca de 1 hora, podendo após este período retornar à sua casa e permanecer em repouso relativo. É interessante caminhar após o exame para eliminar o ar que foi injetado naturalmente. Após a colonoscopia, mesmo que se sinta bem acordado, o paciente **NÃO** pode dirigir nem realizar tarefas que ofereçam riscos à sua integridade devido ao uso de sedativos durante o exame.
10. Ao longo do dia a alimentação deve ser leve com ingestão de bastante líquidos.

SEU EXAME ESTÁ MARCADO DIA: _____ ÀS _____ MANITOL 20% 100 GRAMAS (MANIPULAR EM PÓ) - Ophicimales 19 38763755 /9870407 ou Medicamenta 19 38292166. Opção- 2 frascos de Solução de manitol 20% nas redes de farmácias. Dúvidas ligar: 3876-4542/3876-3545/984241012